



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173; CUI 2491516

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: secretariat@spitalcftm.ro; web: www.spitalcftm.ro



LISTA MEDICAMENTELOR FOTOSENSIBILE

~ din formularul terapeutic al Spitalului Clinic C.F. Timișoara ~

<i>DCI</i>	<i>Exemple denumiri comerciale</i>	<i>Condiții de păstrare</i>	<i>Observații</i>
ADRENALINĂ 1 mg/1 ml (EPINEPHRINUM)	Adrenalina	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	-
METAMIZOL 1 g/2 ml (METAMIZOLUM NATRIUM)	Algocalmin	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	-
AMINOSTERIL N-HEPA8% (AMINOACIZI)	Aminosteril N-hepa	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	-
AMIODARONĂ (AMIODARONUM)	Amiokordin 150mg/3ml Amiodarona Hameln 50mg/ml	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	A nu se păstra la frigider sau congelator.
PANTOPRAZOL 40 mg (PANTOPRAZOLUM)	Controloc	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie folosit imediat.
DEKXETOPROFEN 50mg/2ml (DEKXETOPROFENUM)	Dexketoprofen Tador Dekenor Xedofen	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie folosit imediat.
DOPAMINĂ CLORHIDRAT 5 mg/ ml (DOPAMINUM)	Clorhidrat de Dopamina	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	-
FITOMENADION 10mg/ ml (PHYTOMENADIONUM)	Fitomenadion	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	-
FUROSEMID 20 mg/2ml (FUROSEMIDUM)	Furosemid	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie folosit imediat.
HUMULIN R 100 UI/ml*10ml (INSULINUM HUMANUM)	Humulin R	A se păstra la frigider, iar după deschidere la temperaturi sub 30°C și ferit de lumina.	-
KETOPROFEN 100 mg/2ml (KETOPROFENUM)	Ketoprofen	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	-
LIPOFUNDIN MCT/LCT20% (COMBINAȚII LIPIDE)	Lipofundin Intralipid Somofilipid	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	-
LYSTHENON 100 mg/5 ml (SUXAMETHONII CHLORIDUM)	Lysthenon	A se păstra la frigider (2-8°C), în ambalajul original.	-
NEXODAL 0,4 mg/ ml (NALOXONUM)	Nexodal Forvel	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	-
NORADRENALINĂ 16 mg/8 ml (NORADRENALINUM)	Noradrenalina	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie folosit imediat.
EMULSIE PERFUZABILĂ PERIFERICĂ TRICAMERĂ (COMBINAȚIE DE GLUCIDE, AMINOACIZICU ELECTROLIȚI ȘI LIPIDE)	Nutrifelx Kabiven	Ferit de lumina	Perioada de valabilitate după scoaterea din ambalajul protector și amestecare • la temperaturi între 2-8°C – maxim 4 zile • la temperaturi de 25°C – maxim 48 de ore. După



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173; CUI 2491516

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: secretariat@spitalcftm.ro; web: www.spitalcftm.ro



			deschiderea ambalajului original, emulsia trebuie administrată imediat.
OMEPRAZOL 40 mg i.v. (<i>OMEPRAZOLUM</i>)	Omez Omeprazol	A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	Soluția reconstituită trebuie administrată imediat după reconstituire. Orice cantitate neutilizată trebuie aruncată
PARACETAMOL 1 g/100 ml (<i>PARACETAMOLUM</i>)	Pracetamol B. Braun Paracetamol Kabi Paracetamol Infomed	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie folosit imediat.
PENTOXIFILIN 100 mg/5 ml (<i>PENTOXIFYLLINUM</i>)	Pentoxifilina	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie folosit imediat.
FAMOTIDINA 20 mg PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. (<i>FAMOTIDINUM</i>)	Quamatel	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	-
ATRACURIUM (<i>ATRACURIUM</i>)	Tracrium 50mg/5ml Atracurium Kalceks 10mg/ml	A se păstra la frigider (2° C – 8° C), în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie folosit imediat
TRAMADOL 100 mg/ 2ml (<i>TRAMADOLUM</i>)	Mabron	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	-
VITAMINA B1 100 mg/ 2ml (<i>THIAMINUM</i>)	Vitamina B1	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	-
VITAMINA B6 250 mg/5ml (<i>PYRIDOXINUM</i>)	Vitamina B6	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	-
VITAMINA B12 50 µg/ml sau 1000 µg/ml (<i>CYANCOBALAMINUM</i>)	Vitamina B12	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	-
VITAMINA C 750 mg/ 5ml (<i>ACIDUM</i> <i>ASCORBICUM</i>)	Vitamina C	A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj opac, pentru a fi protejat de lumină.	Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie folosit imediat

Întocmit,

Farm. Diana CÎRLEA